

حمل کے دوران ذیابیطس کا مرض

مریضوں کیلئے معلومات

ہم اُمید کرتے ہیں کہ یہ لیفلٹ آپ کی مدد کرے گا، یہ جاننا اہم ہے کہ آپ کی صحت کی دیکھ بھال کیسے کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے علاج کے بارے میں کوئی سوالات پوچھنے ہوں تو آپ اپنی میڈیکل ٹیم سے پوچھیں۔ وہ آپ کی مدد کیلئے موجود ہیں۔ اس لیفلٹ میں موجود معلومات کو آپ ایک ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں:

[Vimeo.com/556159659/44ce0534da](https://vimeo.com/556159659/44ce0534da)



حمل کے دوران ذیابیطس کا مرض کیا ہوتا ہے؟

ذیابیطس ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ہارمون کو، جس کو انسولین کہا جاتا ہے، مناسب مقدار میں نہیں بناتا اور اس وجہ سے شکر آپ کے خون میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔

آپ کی ایک عام بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس کو جسمیششل ذیابیطس (حمل کے دوران ذیابیطس) کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ حاملہ ہیں تو آپ کا جسم انسولین کی مناسب مقدار نہیں بنا رہا ہے اور آپ کے جسم میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ تر خواتین کی جسمیششل ذیابیطس ختم ہو جاتی ہے۔ خواتین میں یہ بات عام نہیں ہے کہ ان کی جسمیششل ذیابیطس مستقل طور پر رہنے والی ذیابیطس بن جائے۔ ہم آپ کے بچے کی پیدائش کے تین ماہ بعد چیک اپ کا انتظام کریں گے۔ اس بات کا یقین کرنے کیلئے کہ آپ کو مستقل طور پر رہنے والی ذیابیطس تو نہیں ہے۔

یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے خون میں شکر کے درجے کو قابو میں رکھیں کیونکہ اگر یہ درجہ بہت زیادہ ہو جائے آپ کے بچے کو ضرورت سے زیادہ شکر ملے گی جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ معمول سے زیادہ برا ہو جائے۔ ایسا ہونے کی صورت میں لیبر (بچے کی پیدائش کا وقت) کے دوران مسائل بڑھ سکتے ہیں، سزیرین سیکشن (آپریشن سے بچنے کی پیدائش) کی ضرورت ہو سکتی ہے یا ایک غیر معمولی حالت جسے شوگر ڈسٹوشیا (پیدائش کے وقت بچے کا سر باہر آنے کے بعد کندھوں کا اندر بھنس جانا) کہا جاتا ہے، ہو سکتی ہے۔ پیدائش کے بعد اس کی وجہ سے زندگی کے پہلے چند دنوں میں بچے کے خون میں شکر کے درجات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کے بچے کو نیو نیٹل یونٹ میں اضافی دیکھ بھال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

مجھے کیا کرنا چاہئے؟

ایام زچگی میں دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر کی ایک ٹیم، ذیابیطس کے ڈاکٹر زاور نرسز، ماہر غذا اور ڈوائف آپ کی مدد کریں گے:

دن میں چار بار اپنے خون میں شکر کے درجے کو چیک کرنا۔ اپنے خون میں شکر کے درجات کو کم کرنے کیلئے اپنی خوراک میں تبدیلیاں کرنا۔ ذیابیطس اینٹی نیٹل کلیٹکس پر جانا۔ یہ کلیٹکس رائل انفرمری آف ایڈنبرا، ویسٹرن جنرل ہو اسپتال یا سینٹ جونز ہو اسپتال میں ہو سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو اپنے خون میں شکر کو کنٹرول کرنے کیلئے دو اٹھانا۔ مشاعر من گولیاں یا انسولین کے ٹیکے۔ رائل انفرمری آف ایڈنبرا یا سینٹ جونز ہو اسپتال میں اپنے بچے کو جنم دینا تاکہ نیو نیٹل یونٹ تک رسائی ہو اگر آپ کے بچے کو خاص دیکھ بھال کی ضرورت پڑ جائے۔

دن میں چار بار اپنے خون میں شکر کے درجے کو چیک کرنا

ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اپنے خون میں شکر کی مقدار کو کیسے چیک کر سکتے ہیں، آپ ایک فنگر پرک ڈیوائس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایک آن لائن ایپ پر ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے بی پی سے کہا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ سزپس اور سونیاں دے بنی آپ کو ضرورت ہوگی اور ان کو آپ کیلئے نئے میں شامل کیا جائے گا۔ جب یہ چیزیں ختم ہونے والی ہوں تو آپ ان کو ضرورت کے مطابق مزید لے سکیں گے۔

اگر آپ کے خون میں شکر کے درجات درج ذیل سے پلان اہداف سے زیادہ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں**:

<p>ناشتے سے قبل</p> <p>Before breakfast</p>  <p>5.5mmol/L</p>	<p>دوپہر کے کھانے سے قبل</p> <p>Before lunch</p>  <p>6.0mmol/L</p>
<p>رات کے کھانے سے قبل</p> <p>Before evening meal</p>  <p>6.0mmol/L</p>	<p>رات کے کھانے کے دو گھنٹے بعد</p> <p>2hr after evening meal</p>  <p>7.0mmol/L</p>

اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں تاکہ آپ کے خون میں شکر کی مقدار کو کم کرنے میں مدد ملے

ڈائٹیشنز کھانے پینے کی اشیاء اور طرز زندگی کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے تاکہ آپ کو اپنے خون میں شکر کی مقدار ٹھیک رکھنے میں مدد ملے۔

ہو سہل میں ذیابیطس سپیشلسٹ نرس کے ساتھ اپنا ٹیسٹ پر آپ کو بلڈ گلو کو زمانہ نثر دیا جائے گا اور اس کے بعد سات دن کے اندر جسٹیشنل ڈائٹیشن کیونٹی ڈائٹنگ سروس آپ سے ٹیلیفون پر رابطہ کرے گی اور ایک اپنا ٹیسٹ دی جائے گی۔ یہ ایک ویڈیو لنک پر ہوگی، آپ اپنے سمارٹ فون، ٹیبلیٹ یا کمپیوٹر پر جوائن کر سکتے ہیں۔

آپ کو ویڈیو لنک پر جسٹیشنل ذیابیطس ایجوکیشن گروپ سیشنز دیئے جائیں گے اور آپ کو ویڈیو لنک پر اکیلے اپنا ٹیسٹس دی جائیں گی۔ آپ کی پہلی گروپ اپنا ٹیسٹ تقریباً پچاس تا ساٹھ منٹ کی ہوگی۔ مزید ویڈیو اپنا ٹیسٹس تقریباً پندرہ تا بیس منٹ کی ہوں گی اور ان کا انتظام ڈائٹیشن کے ساتھ براہ راست ہر پندرہ دن کے بعد کیا جائے گا، یا جیسے بھی ضرورت ہوگی۔ لوگ آن لائن اپنا ٹیسٹس کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ کہیں سفر کر کے جانا نہیں پڑتا اور آپ ان اپنا ٹیسٹس کو اپنے دیگر کاموں کے درمیان کر سکتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ کو فیس ٹو فیس یا ٹیلیفون اپنا ٹیسٹس کی ضرورت ہوئی تو برائے مہربانی اپنی ڈائٹیشن کو بتائیں۔ اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں۔

دوائی لیں اگر ضرورت ہو

اگر آپ کے خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہے اور خوراک میں تبدیلی کرنے اور ورزش وغیرہ کرنے سے یہ کم نہیں ہو رہی تو ہم آپ کو دوائی لینے کا مشورہ دیں گے۔

• مٹفارمن ٹیبلٹس

مٹفارمن آپ کے خون میں شکر کے درجے کو کم کرتی ہے، یہ آپ کے جسم کو انسولین کیلئے زیادہ حساس بناتی ہے جو کہ آپ پہلے ہی بنا رہے ہیں۔ یہ ایک محفوظ دوا ہے اور یہ آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ کو مٹفارمن ٹیبلٹس دی گئی ہیں لیکن آپ ان کو مت لیں۔ بجز یہ کہ آپ سے کہا جائے۔

برائے مہربانی ان کو اپنے گھر میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ لیں۔ مٹفارمن لینے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو کھانے کے ساتھ لیں۔ اگر ناموافق اثرات بہت زیادہ ہوں یا طبیعت ٹھیک نہ ہو پائے تو برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر یا بیٹیس کی ٹیم کو بتائیں۔

• انسولین انجیکشنز

آپ کی پوری کوشش کے باوجود، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی خوراک میں تبدیلی لانے اور مٹفارمن کھانے کے باوجود اپنے خون میں شکر کے درجات کو کنٹرول نہ کر پائیں۔ ایسی صورت میں ہم انسولین انجیکشنز لگانے کا مشورہ دیں گے، اس کیلئے انسولین پین استعمال کیا جاتا ہے جس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے اور بالکل درد نہیں ہوتا۔

آپ کے بچے کی پیدائش

زیادہ تر خواتین اپنی متوقع تاریخ پر بچے کو جنم دیتی ہیں۔ جب وقت قریب آتا ہے، او بسٹریٹک ٹیم و جانٹل برتھ (بچے کی پیدائش) اور پیدائش کے وقت سے متعلق خطرات اور فوائد کے بارے میں بات چیت کرتی ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کی نگرانی میں میٹرنٹی یونٹ میں بچے کو جنم دیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جوادویات آپ زمانہ حمل میں ذیابیطس کیلئے لے رہے ہوتے ہیں ان کو روک دیا جائے گا جب آپ لیبر (درد زہ) میں جاتے ہیں، لیکن ہر ایک یاد رکھنے کے بعد آپ کے خون میں شکر کے درجے کو چیک کیا جائے گا۔ اگر یہ معمول سے زیادہ ہو تو بقایا لیبر میں آپ کو انسولین کی ڈرپ لگائی جائے گی۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ لیبر کے دوران آپ کے بچے کے دل کی دھڑکن کی رفتار کو مسلسل چیک کیا جائے گا۔ پیدائش کے بعد آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہے گا بجز یہ کہ اُسے اضافی دیکھ بھال کی ضرورت ہو۔ یہ مکمل طور پر محفوظ بات ہے کہ آپ بچے کو چھاتی کا دودھ پلائیں کیونکہ تمام اودیات جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حمل اور چھاتی کا دودھ پلانے کے دوران محفوظ ہوتی ہیں۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے بچے کی پیدائش کے بعد اُس کو دودھ پلانا شروع کر دیں اور ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد پلائیں تاکہ بچے کا بلڈ گلوکوز (خون میں شکر) کا درجہ ٹھیک رہے۔ پیدائش کے دو سے چار گھنٹے کے بعد بچے کی اڑی میں سے سوئی کی مدد سے خون نکال کر چیک کیا جاتا ہے اس بات کا یقین کرنے کیلئے کہ بچے کے خون میں شکر کا درجہ کم تو نہیں ہے۔ اگر یہ کم ہو تو آپ کے بچے کو مزید دودھ پینے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات بچے کو نیونٹیل یونٹ میں دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

بعد میں مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟

زیادہ تر خواتین کی جسٹیشیل ذیابیطس بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے، اسلئے آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ذیابیطس کی ساری اودیات لیما بند کر دیں۔ بعض کیسز میں آپ سے کہا جاسکتا ہے کہ آپ اگلے چند ہفتوں کے دوران کبھی کبھی اپنے خون میں گلوکوز کو چیک کریں اور سال میں ایک بار HbA1c ٹیسٹ کروائیں۔ اپنے بچے کی پیدائش کے تقریباً بارہ ہفتوں کے بعد آپ کو بلڈ ٹیسٹ کیلئے بلا یا جائے گا اس بات کا یقین کرنے کیلئے کہ آپ کے بلڈ میں شکر کے درجات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے خون میں شکر زیادہ سے تو ڈاکٹر آپ کو مزید تشخیص کیلئے رابطہ کرے گا اور آپ کو آپ کی خوراک، ورزش، اور وزن کے بارے میں مشورہ دے گا۔ جسٹیشیل ذیابیطس ہونے کی وجہ سے مستقبل میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہو جانے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ایک چُست زندگی بسر کرنا اور متوازن غذا کے استعمال سے اس خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

آپ کے بچے کی پیدائش کے تقریباً چھ ماہ بعد جسٹیشیل ڈائٹیک سروس آپ کی صحت کے بارے میں پوچھنے کیلئے آپ کو ایک ویڈیو کال کی دعوت دے گی۔ یہ کال تقریباً پندرہ منٹ کی ہوگی اور وہ آپ کی صحت کے بارے میں پوچھیں گے، یہ پتہ لگائیں گے کہ اگر آپ کو مسلسل مدد یا اضافی سروسز کی ضرورت ہے۔ آمنے سامنے ملاقات، فون یا ویڈیو کال پر بات اور ڈیجیٹل سپورٹ دستیاب ہے، مثال کے طور پر لٹس پریونٹ ڈائٹینس پروگرام، بی بی سٹپس ڈیجیٹل پروگرام اور ویٹ میجمنٹ پروگرامز تک رسائی اگر مناسب ہو۔

اگر آپ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مدوائف کو بتائیں کہ آپ کو جسٹیشیل ڈیابٹس تھی۔ حمل کے دوران خون میں شکر کو کنٹرول کرنے سے آپ کے بچے کو آنے والی زندگی میں موٹاپا ہونے اور ڈیابٹس ہونے کا خطرہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔

ہم سے رابطہ کریں

اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور آپ کو اپنے بچے کے بارے میں کوئی تشویشات ہوں تو کال کریں: 0131 242 2657

ڈیابٹس سپیشلسٹ نرسز۔ سوموار تا جمعہ صبح نو بجے تا شام چار بجے پبلک ہائیڈیز کے علاوہ۔ برائے مہربانی، اپنا نام، تاریخ پیدائش اور ٹیلیفون نمبر چھوڑیں اور کوئی آپ کو واپس فون کرے گا۔

- Western General Hospital – 0131 537 1746, GDMVirtualClinic.WGH@nhslothian.scot.nhs.uk
- Royal Infirmary of Edinburgh - 0131 242 1471
- St Johns - 01506 523 856

ڈیابٹس ڈاکٹر آن کال۔ ہفتہ اتوار / دفتری اوقات کے باہر

- Western General Hospital – 0131 537 1000
- Royal Infirmary of Edinburgh - 0131 537 1000
- St Johns - 01506 523 000

Astley Ainslie Hospital (آٹسلی اینزلے ہوسپتال) میں (جسٹیشیل ڈیابٹس ڈائٹینسز) Gestational Diabetes Dietitians

0131 537 9169 سوموار تا جمعہ صبح آٹھ بجے تا شام پانچ بجے

اگر آپ کو یہ لیفلٹ کسی اور فارمیٹ یا زبان میں درکار ہو تو برائے مہربانی اپنی میڈیکل ٹیم سے پوچھیں۔

